

**Campanha de Sobrevivência a sepse
CHECK-LIST**

Nome do paciente: _____ **Leito:** _____

Data da sepse grave: ____/____/____ **Hora:** ____:____

- Colhido lactato sérico
- Colhido hemocultura (idealmente antes do antibiótico)
- Administrado antibiótico (idealmente antes de uma hora)
- Checado lactato sérico antes de 30 minutos
- Se lactato alterado ou hipotensão, administrado 20 ml/kg de cristalóide em 30 minutos
- Se manteve hipotensão imediatamente após item anterior iniciado noradrenalina
- Se manteve hipotensão ou lactato > 2 x o valor normal, passado acesso venoso central
- Colhido SvO₂.

**AGORA JÁ SE PASSARAM SEIS HORAS DO MOMENTO INICIAL.
RESPONDA A MAIS DOIS QUESITOS:**

- Feito reposição volêmica **pelo menos** até PVC > 12 cmH₂O.
- Otimizada SvO₂ >70% com mais reposição volêmica, dobutamina e transfusão de hemáceas nos casos indicados.

Além disso, pense nas próximas 24 horas:

- Se choque séptico refratário, avaliar corticoterapia 50 mg 6/6 hs
- Se em ventilação mecânica, manter pressão de platô < 30 cmH₂O
- Iniciado controle glicêmico conforme protocolo da Unidade

- Todos os passos estão registrados em prontuário!

PARABÉNS!!

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!

